

שמור על חיים פשוטים עם משאף קל לשימוש

חדש

אתר הדרכה למטופלי
סימביקורט טורבוהלר
www.mysymbicort.co.il
סיסמא: לנשום



SCAN ME

החזר את
המכסה למקומו



מהמטופלים, במחקר רב מרכזי,
מצאו כי טורבוהלר היה
קל לשימוש עבורם¹

96%
Out of n=138

Reference: Watson J. Curr Med Res Opin. 1990;11(10)654-660

מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. יש לעיין בעלון לרופא טרם מתן מרשם

SYMBICORT® Turbuhaler is indicated in the regular treatment of asthma where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β_2 -adrenoceptor agonist) is appropriate: patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and "as needed" inhaled short-acting β_2 -adrenoceptor agonists; or patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β_2 -adrenoceptor agonists.

SYMBICORT® Turbuhaler 80/4.5 mcg/dose Maintenance and Reliever is indicated for use in adults (18 years and older). SYMBICORT® Turbuhaler 80/4.5 mcg/dose is indicated for use in children and adolescents (6 years and older) as a maintenance treatment only. Symbicort Turbuhaler 80/4.5 mcg/dose is not appropriate in patients with severe asthma.

SYMBICORT® Turbuhaler 160/4.5 mcg/dose Maintenance and Reliever is indicated for use in adults and adolescents (12 years and older).

SYMBICORT® Turbuhaler 320/9 mcg/dose is indicated in adults and adolescents (12 years and older) as a maintenance treatment only.¹

AstraZeneca

אסטרזנקה (ישראל) בע"מ, רח' החרש 6, תד. 1455,
דוד השרון 4524075 • טל: 09-7406528 • פקס: 09-7406527

Symbicort®
budesonide/formoterol